

USO DE MISOPROSTOL EN OBSTETRICIA

INDICACION	EDAD GESTACIONAL	DOSIS/VIA	FRECUENCIA	
MIFEPRISTONA Y MISOPROSTOL				
MIFEPRISTONA 200 MG VÍA ORAL DOSIS ÚNICA EN TODAS LAS SEMANAS				
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO	Hasta las 10 semanas	Misoprostol 800 mcg/BUC.	24 a 48 horas después de la dosis de Mifepristona	
	De 10 a 13 semanas	Misoprostol 800 mcg VAG. y 400 mcg VAG., S.L.	Misoprostol 800 mcg, vaginal 36 a 48 horas después de Mifepristona, luego 400 mcg vaginal o sublingual cada 3 horas	
	De 13 a 24 semanas	Misoprostol 400 mcg/BUC., VAG., S.L.	Iniciar 24 a 48 horas después de Mifepristona, cada 3 horas	
	MISOPROSTOL SOLO			
	Hasta las 13 semanas	Misoprostol 800 mcg/VAG., S.L.	VAG.: Cada 3 a 12 horas máximo 3 dosis	
			S.L.: Cada 3 horas máximo 3 dosis	
De 13 a 24 semanas	Misoprostol 400 mcg/VAG., S.L.	Cada 3 horas hasta expulsión de feto y placenta		

INDICACION	EDAD GESTACIONAL	DOSIS/VIA	FRECUENCIA
ABORTO INCOMPLETO	Hasta las 13 semanas	Misoprostol 400 mcg/S.L. o 600 mcg V.O.	Dosis única
	Más de 13 semanas	Misoprostol 200 mcg/VAG., S.L., BUC.	Cada seis horas
ABORTO DIFERIDO	Hasta las 13 semanas	Misoprostol 800 mcg/VAG.	Dosis única
		Misoprostol 600 mcg/S.L.	Cada 3 horas máximo 3 dosis
	Más de 13 semanas	Misoprostol 200 mcg/VAG., S.L., BUC.	Cada 6 horas
PREPARACIÓN CERVICAL ANTES DE EVACUACIÓN QUIRÚRGICA	Más de 12 semanas, o antes si está indicado	Misoprostol 400 mcg/S.L.	2 a 3 horas antes del procedimiento
		Misoprostol 400 mcg/VAG.	3 horas antes del procedimiento
		Mifepristona 200 mg/V.O.	24 a 48 horas antes del procedimiento
INDUCCIÓN DE LABOR DE PARTO*	Embarazo de término	Misoprostol 25 mcg/V.O., VAG.	V.O.: Cada 2 horas
			VAG.: Cada 6 horas
PREVENCIÓN DE HEMORRAGIA POSPARTO		600 mcg/V.O.	Dosis única
TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POSPARTO		800 mcg/SUB.	Dosis única

*Mujeres con cesárea previa NO PUEDEN usar misoprostol para la inducción de labor de parto. Mujeres con cesárea previa pueden usar misoprostol para todas las otras indicaciones de esta tarjeta.

REFERENCIAS:

1. Ipas. (2016). *Actualizaciones clínicas en salud reproductiva*. Chapel Hill, Carolina del Norte: Ipas.
2. Organización Mundial de la Salud. (2014). *Recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto*. Ginebra, Suiza: OMS.
3. Organización Mundial de la Salud. (2011). *WHO recommendations for induction of labor*. Ginebra, Suiza: OMS.