

Para 2016,



la carga de **enfermedad por causas relacionadas con el embarazo**, el parto y el puerperio representó :

**1.3% del total** de los años de vida saludables perdidos entre las niñas de **10 a 14 años.**

**1.8% del total** de los años de vida saludables perdidos entre mujeres adolescentes de **15 a 19 años.**



En México, las adolescentes embarazadas son más propensas a **complicaciones de orden psicosocial** como lo son:

- Rezago educativo
- Desigual acceso a oportunidades de desarrollo
- Barreras para obtener un empleo que implique mayor formación académica y experiencia
- Necesidad de apoyos gubernamentales
- Ser solteras y no tener derechohabiencia
- Muerte prematura

Las niñas y adolescentes se enfrentan a **mayores dificultades para acceder a información y servicios de aborto seguro** por lo que es frecuente que interrumpen el embarazo en etapas más avanzadas, recurran a personas no calificadas, empleen método inseguros y pospongan la búsqueda de atención médica.

Los datos sobre el aborto inseguro en niñas **menores de 15 años** son prácticamente inexistentes en la mayoría de los países, especialmente en aquellos con leyes restrictivas y/o con deficientes sistemas de registro. Sin embargo, **en México el 2.23%\*** de las atenciones en niñas de entre **10 y 14 años**, fueron por aborto\*\*.



A falta de un **aborto seguro** se puede presentar:

- hemorragias
- septicemia
- lesiones en órganos internos
- tétanos
- esterilidad
- muerte

Fuente: \*Centro de Análisis de Datos A.C. "Egresos Hospitalarios" en Violencia Sexual en Adolescentes.

\*\* Casos por aborto natural y no por ILE.

# RIESGOS Y CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO A EDADES TEMPRANAS

La evidencia es concluyente acerca de los efectos adversos que tiene el embarazo en niñas y adolescentes.

## Las menores de 15 años

tienen probabilidades significativamente más elevadas de sufrir padecimientos como la **eclampsia, anemia,**



**hemorragia postparto y endometritis puerperal** que las adolescentes **mayores de 15 años.**

De las **18.5%** de las niñas entre **10 y 14 años** fueron atendidas en la Secretaría de Salud por complicaciones\*:

- ▶ **8.7%** Parto
- ▶ **3.7%** Por complicaciones del embarazo que requieren una atención a la madre
- ▶ **2.23%** Por embarazos que terminaron en aborto.

**Fuente:**

\*De acuerdo con el Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH)

\*\*Según el Observatorio de Mortalidad Materna en México,

## Entre 2016 y 2017

la razón de mortalidad materna fue de **32 defunciones maternas** por cada **mil nacidos vivos** en mujeres entre 15 y 24 años de edad.\*\*



Las principales causas de muerte materna en mujeres en etapa reproductiva, son:

